

Consideración

- Paciente
- Motivo de uso
- Zona
- Terapia
- Obstrucción



Colocación

- Preparación de la piel
- Manos limpias
- Bisel hacia arriba
- Ángulo de inserción
- Vena estable
- Flash-back
- Colocación segura



Factores de riesgo

- Dosificación inadecuada
- Obstrucción
- Flebitis
- Golpe en la pierna
- Infección
- Duración colocación
- Complicación por pinchazo de aguja (paciente y personal)



| Calibre | Código de color | Diám. ext. mm | Tam. vena mm | Longitud mm | Flujo ml/min |
|---------|-----------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 24G | Amarillo | 0.7 | 1.4 | 19 | 22 |



Para usar en:



| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|----|----|
| 22G | Azul | 0.9 | 1.8 | 25 | 35 |
|-----|------|-----|-----|----|----|



Para usar en:



Administración de fluidos subcutáneos

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|----|----|
| 20G | Rosa | 1.1 | 2.2 | 32 | 60 |
|-----|------|-----|-----|----|----|



Para usar en:



Terapia de fluidos de choque

| | | | | | |
|-----|-------|-----|-----|-------|-----|
| 18G | Verde | 1.3 | 2.6 | 32/45 | 105 |
|-----|-------|-----|-----|-------|-----|



Para usar en:



Reanimación con líquidos de alto volumen

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|----|-----|
| 16G | Gris | 1.8 | 3.6 | 50 | 210 |
|-----|------|-----|-----|----|-----|



Para usar en:



| | | | | | |
|-----|---------|-----|-----|----|-----|
| 14G | Naranja | 2.2 | 4.4 | 50 | 345 |
|-----|---------|-----|-----|----|-----|



Para usar en:

